もあります。

食中毒とは、原因と

もあります。

食品の見た目に

# 何か

絵を描いています。モ ナリザが前回モデルを にモナリザをモデルに

っとりしながら絵を描 す美しいモナリザにう ダビンチは相変わら 噌汁です。ダビンチが

山城

見えにくい

ダビンチは久しぶり

つとめたのは5年前で

博子 す。 ました。やはり同じと と同じよ。5年間同じ た。「いいえ。いつも いわ」ダビンチはまば 化粧品しか使っていな もの塗っている?」ダ ような気がしました。 ビンチはたずねまし う額になにか黒っぽい ころに影があるようで たきをしてから、もう 「モナリザさん、きょ 度モナリザを見つめ

ここにちゃんとあるじ

のところにテンプラス した。「えっ?

ぼく

っていないよ」「あら

ゃない」ダビンチは梅

緑内障になってしまったら

ょろきょろしました。 干から視線をずらしき

「本当だ。でもさっき

りはじめました。メニ ューは幕の内弁当と味 リザと一緒に昼食をと よう」ダビンチはモナ な。そろそろ昼食にし 「疲れているのか わよ」。 査を受けたほうがいい とじゃない?眼科で検 が見にくいっていうこ か見にくかったんだ」 さんの額のあたりが何 「それって視野の一部

管理栄養士

風邪のような症状の時 腹痛、嘔吐など)です どの健康被害が起こる よって、腹痛・下痢な 付着した食品や、有毒 が、発熱、倦怠感など、 ことをいいます。主な た食品を食べることに 症状は、胃腸炎(下痢、 ・有害な物質が含まれ なる細菌やウィルスが を受けましょう。周囲 発熱など体に異常があ も大切です。 に感染を広げないこと るときは、医師の診察 予防の3原則 もし、腹痛・下痢・ ①つけない

③ やっつける ②増やさない

## ①つけない

めには、原因となる菌 ・ウィルスを食べ物に 食中毒を予防するた たままにしない。解凍 に冷蔵庫にしまう。作 った料理を室温に置い

直接人に感染すること

冬に流行するノロウィ

ことはありませんが、

人から人へ感染する

ルスは感染力が強く、

しましょう。

手、食器、調理器具を 清潔に保つ。手をふく 付けないことが重要で ハンカチやタオルはこ 食べ物に直接触れる

安心しないで

板を使いわける。肉・ 済み食品の包丁・まな まめに取り替える。 いよう小分けにする。 が他の食品にかからな 魚を保存するときは汁 肉・魚と野菜・調理

食中毒の怖いところ

②増やさない

ころです。見た目に安 を実践し食中毒を予防 は異なり 「味」 「色」 「に 心せず日常的に3原則 おい」が変わらないと は、食べ物が腐るのと

きな温度帯です。

購入した食品はすぐ

多湿は食中毒菌の大好


梅雨時、夏場の高温

するときは室温におか ず、レンジや冷蔵庫を

むずむず脚(レスト

# ③<br /> やっ<br /> つける

は漂白剤や熱湯でこま でよく洗う。調理器具 で食べる野菜類は流水 ます。肉類は中心まで が加熱により殺菌され めに殺菌する。 しっかり火を通す。生 食中毒菌のほとんど



### の緑内障 さまざまな型

眼科医師

額のあたりに影がある

いていましたが、ふと

ご飯の真ん中にある梅

のことです。モナリザ 干を見つめていたとき

が「このテンプラ美味

しいわね」と微笑みま

も正常でした。 た。視力は正常でし 生は検査をはじめまし た。眼圧(眼の硬さ) た。ミケランジェロ先 口眼科をおとずれまし 眼底検査の結果、視 2人はミケランジェ ダビンチの緑内障は

神経に緑内障を疑う所 も行いました。 を測る検査(OCT) 見があり、視野検査を た。視神経線維の厚さ 行うことになりまし 型でした。

だ。実はけさ絵を描い は目に入らなかったん

ている時も、モナリザ

「ダビンチさんの視 ・頭痛・嘔吐・視力低 す。閉塞隅角緑内障と しないと危険な型で いうのは、急激に眼痛

は結果を説明してくれ ミケランジェロ先生

神経は一部がうすくな

下などの症状があらわ

第3話

回か通っていただいて 正常ですので、まず何 チさんの場合、眼圧は 障です。緑内障の場 られます。これは緑内 が必要ですが、ダビン 相当する視野障害が見 合、眼圧を下げる治療 っていて、その部分に

す。これは急激に眼圧 うかく)緑内障という 開放隅角(かいほうぐ 障という型がありま が上がってすぐに治療 ほかに閉塞隅角緑内 ら一生つきあっていか ります。 を調べていく必要があ 期的に受け進行の具合 圧・視野検査などを定 ですが、視力検査・眼 なければいけないもの

ともあります。 は手術が必要になるこ 進行の具合によって

けられます。

後者の原因として

から目薬を開始しま がこのタイプです。 ることです。 ずは正しい診断をつけ が異なりますので、ま ザーなど治療のしかた れによって点眼・レー ろいろな型があり、そ 内障発作といわれるの れる型で、いわゆる緑 の、慢性のものなどい 緑内障にも急性のも

緑内障と診断された は、原因がはっきりわ からないものと、他の むずむず脚症候群

を引き起こすのではな うまく作られず、症状 はドパミンを作る過程 働きをします。また鉄 や、鉄が関与している 経伝達物質の1つであ で欠かすことのできな と言われています。 いかと考えられていま 不足によりドパミンが い物質です。その鉄の 運動機能を潤滑にする るドパミンの機能障害 ドパミンは、様々な 妊娠 日本 乏性貧血、葉酸欠乏、 ンソン病、関節リウマ チなどが挙げられま 米人にくらべると 言われています 人には比較的少な

す。

で、医師とよく相談す

くなることもあるの

ることをおすすめしま

なって起こるものに分 病気や薬などが原因と 

### がはっているようだ」 り、「脚を動かしたい」 きや横になっている時 という病名を聞いたこ 症状は夕方から夜間に てる」などの症状が現 に、脚に不快感が起こ とがありますか? レスレッグス)症候群 「むずむずする」「虫 「ピクピクする」「ほ じっと座っていると むずむず脚症候群の

むずむず脚症候群

中村めぐみ 薬剤師 (たくみ外苑薬局)

が多いと報告されてい 女性の患者さんの割合 多く、男性にくらべて 歳以上の中高年の方に 多いのです。主に40 は2~5%と意外にも が、人口にしめる割合

ることとして、カフェ 改善される場合もあり 張のこわばりを取ると ることです。脚のマッ 取、過度の喫煙は避け イン、アルコールの摂 サージをして筋肉の緊 日常生活で気をつけ  $\Diamond$ 

副作用や治療費だけ高 れる薬があります。 だけに、効果もなく、 んかんの治療に使用さ のパーキンソン病やて ある薬は少なく、一部 むず脚症候群に適応が 日常生活に支障をきた ことがあります。むず り場合は薬が使われる 症状の原因が様々な それでも改善せず、

な説として、脳内の神

は、

慢性腎不全、鉄欠

糖尿病、パーキ

なっていま

明らかには 原因はまだ

せん。有力

脚症候群の

むずむず

なります。 眠の原因と かけて現れやすく、

不

### 「命は平等」の看護を充実 発展させたい! 読者のみなさん、看護師 をぜひご紹介ください。 問い合わせ先 代々木病院総看護師長室

電話 03 (5411) 9581 FAX 03 (3404) 7456