




歯周病には5つの進行段階があることや、症状についてお分かりいただけただでしょうか？一生、ご自身の歯でお食事を楽しむためにも、お口に異常がみられた場合には、すぐに歯科医院にてみてもらうことをおすすめします。

今回は歯周病の進行過程についてお話をします。

前々回お話ししたように、歯周病はある日突然、重度の症状が出るのではなく、徐々に進行する病気です。重度になってから慌てて治療するのは、歯の根が溶けて落ちてしまいます。上記の図のように歯周病は歯を支えている歯槽骨が溶け、支えている歯槽骨が減ることにより歯がグラグラになっていくので、乳歯が永久歯に生え変わる際、乳歯がグラグラになって抜け落ちる場合のように、歯の根が溶けてなくなる病気ではないです。なので、重度歯周病で抜いた歯は歯の根は吸収されておらず、根っこがしっかりとなります。

歯周病はひどくなる

と、歯が揺れてきて抜けて落ちてしまいます。上記



代々木病院 歯科医師 監物佐米子

歯周病の進行度合いについて



代々木歯科コーナー

連載

くすりの話 あれこれ 147

インフルエンザワクチン

代々木病院 薬剤師 松浦由佳

お伝えしたいと思います。

インフルエンザワクチンとは？

ホルマリン処理等により毒性をなくしたインフルエンザウイルスで、毎年、流行が予測されるA型株2種類、B型株2種類が入っています。

これを体内に接種することで、抗体が作られて発症を抑えます。

〈効果〉

感染を完全に阻止する効果はありませんが、インフルエンザの発病を一定程度予防することや、発病後の重症化を予防する事に関しては、一定の効果があるとされています。

効果はありますが、インフルエンザワクチンについて

〈接種回数〉

13歳以上：原則1回接種
13歳未満：2回接種

〈副反応〉

接種した場所(局所)の赤み(発赤)、はれ(腫脹)、痛み(疼痛)等が挙げられ、接種を受けた方の方の10〜20%に起こりますが、通常2〜3日でなくなります。全身性の反応としては、発熱、頭痛、寒気(悪寒)、だるさ(倦怠感)等があり、接種を受けた方の方の5〜10%に起こりますが、こちらも通常2〜3日でなくなります。



〈効果持続期間〉

ワクチンの効果は接種後2週間〜5ヶ月程度。抗体が作られる迄に約2週間かかる為、流行時期を迎える前に接種する必要があります。

サプリメントに頼らない生活

薬剤師 藤竿伊知郎 (外苑企画商事)



売ったとして医師が逮捕されました。経営する診療所と連携するサプリメント製造・販売会社で販売した商品に「EPAは青魚の成分です。心筋梗塞、脳梗塞、大腸ガン、胆のうガン、前立腺ガン、乳ガン、子宮ガン、高血圧、動脈硬化症、にきび、吹き出物の予防に欠かせません」と表示していました。警察発表では、それ以外にもエステサロンにサプリや健康茶を「ガン・インフルエンザ・コロナウイルス予防」に効くとして販売するなど、20年間に合計8500万円程の売上があったとされています。

消費者も、使用者の感想を元にした広告は冷めた目で見ていますが、押し出しの良い医師からの

健康情報があふれる中、「診療現場で生まれ育ったサプリメント」となれば信頼しなくなるのではないのでしょうか。ところが10月23日、「がんの予防」などの効能をうたって未承認医薬品を販売したとして医師からの

(65) 医師がすすめるサプリの信頼性



3階渡り廊下は「紅葉」が見ごろ



11月中旬から3階の渡り廊下では、「紅葉」が見ごろを迎えています。リハビリ中の患者さんとセラピストで共同作成しています。廊下を通る患者さんも季節を感じながら療養をしています。



石井和子 (渋谷区)